

ესპაკოქცი 2,5% (Espacox)

Toltrazuril

წამლის ფორმა: პერორალურად მისაღები ხსნარი, გამოიყენება ვეტერინარიაში.

შემადგენლობა: 1მლ შეიცავს: ტოლტრაზურილს 25 მგ.

დამხმარე ნივთიერებები: ტროლამინი, პროპილენგლიკოლი, ბენზილის სპირიტი, პროპილენგლიკოლი 400

გამოშვების ფორმა: 1ლ პლასტიკურ ფლაკონში.

ფარმაკოთარაპიული ჯგუფი: ანტიპარაზიტული, ანტიკოქციდიური პრეპარატი.

ფარმაკოლოგიური თვისებები

ესპაკოქცი 2,5% ანტიკოქციდიური საშუალებაა ტრიაზინტრონის ჯგუფიდან, ახასიათებს ფართო სპექტრის კოქციდიოციდური მოქმედება, კოქციდიების (ეიმერიების) უჯრედშიდა განვითარების (გამეტოგონია და შიზოგონია) ყველა სტადიაზე. ეფექტურად მოქმედებს *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. necatrix*, *E. tenella*, *E. mitis*, *E. praecox*, *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. anceris*, *E. truncata*, მიმართ.

რესპირატორული ფერმენტების ბლოკირებით ტოლტრაზურილი ახდენს ზეგავლენას მიტოქონდრიებისა და კოქციდიის ბირთვის გაყოფაზე მაკროგამეტოციდების ფორმირების პროცესის დარღვევით.

პრეპარატი ნელა შეიწოვება კუჭნაწლავის ტრაქტიდან და ავლენს კოქციდიოციდურ მოქმედებას ლორწოვან გარსზე. ორგანიზმში მეტაბოლიზდება სულფოდაჟანგვისა და ჰიდროქსილირებით, შუალედური პროდუქტის სულფოქსიდისა და სულფონის წარმოქმნით. ტოლტრაზურილი ორგანიზმიდან ძირითადად გამოიყოფა უცვლელი სახით (70%), ასევე მეტაბოლიტების სახით ფეკალთან ერთად.

ესპაკოქცი 2,5% ორგანიზმზე მოქმედების ხარისხის მიხედვით ეკუთვნის ნაკლებტოქსიკურ ნივთიერებებს (მე-4 კლასი საშიშროების).

გამოყენების ჩვენებები

გამოიყენება ქათმის, ბატის, იხვის და ინდაურის კოქციდიოზის სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის

მაქსიმალური პროფილაქტიკური ეფექტის მისაღწევად და იმისათვის რომ შემცირდეს ოოციტების გარემოში გამოყოფა, კოქციდიოზის მიმართ არაკეთილსაიმედო მეურნეობებში პრეპარატი უნდა დაენიშნოს ფრინველს პირველი კლინიკური ნიშნების გამოვლენისთანავე.

გამოყენების წესი და დოზირება

პრეპარატი გამოიყენება სასმელ წყალთან ერთად სადღეღამისო დოზით 7 მგ ტოლტრაზურილი ფრინველის 1კგ. ც.წ-ზე (28მლ პრეპარატი, 100კგ ც.წ-ზე), რაც ექვივალენტურია:

- 1მლ პრეპარატი გახსნილი 1 ლ სასმელ წყალში, რომელიც ფრინველს ეძლევა დასაღვეად 48სთ-ის განმავლობაში ან

- 3მლ პრეპარატი 1 ლ სასმელ წყალში გახსნილი, ეძლევა 8სთ-ის განმავლობაში, 2 დღე ზედიზედ. *დაავადების მძიმე ფორმის მიმდინარეობისას მკურნალობის კურსი მეორდება 5 დღის შემდეგ.*

ესპაკოქცი 2,5%-ის სამკურნალო ხსნარი აქტივობას ინარჩუნებს 48სთ-ის განმავლობაში. პრეპარატი ხმარების წინ უნდა შეინჯღრეს.

პრეპარატი თავსებადია საკვებდანამატებთან, ვიტამინებთან და ფრინველის სამკურნალო სხვა საშუალებებთან ერთად.

უკუჩვენებები

ინდივიდუალური მგრძნობელობა პრეპარატის კომპონენტების მიმართ.

იკრძალება პრეპარატის გამოყენება კვერცხმდებელი დედლებისთვის, კვერცხებში პრეპარატის დაგროვების გამო.

გვერდითი მოვლენები

ინსტრუქციის მიხედვით რეკომენდებულ დოზებში პრეპარატის გამოყენებით გვერდითი მოვლენები არ გამოვლენილა

განსაკუთრებული მითითებები

- აწეული ინდივიდუალური მგრძნობელობისა და ალერგიული რეაქციის გამოვლენისას ცხოველებს ენიშნება ანტიჰისტამინური საშუალებები და სიმპტომატური მკურნალობა.

- არ შეიძლება მისი გამოყენება სხვა კოქციდიოციდური პრეპარატებთან ერთად.
- პრეპარატის გამოყენებისას დაცული უნდა იქნას პირადი ჰიგიენის და ვეტერინარიულ პრეპარატებთან მუშაობის უსაფრთხოების წესები. პრეპარატის ხელეზზე, სახეზე, კანზე ან ლორწოვან გარსზე მოხვედრისას უნდა ჩამოიბანოთ დიდი რაოდენობის გამდინარე წყლით.

დაყოვნების პერიოდი

სახორცედ დაკვლა დასაშვებია პრეპარატის მიღებიდან ბროილერის წიწილების 14 დღის, ინდაურის, იხვის, ბატის 16 დღის შემდეგ.

აღნიშნულ ვადაზე ადრე იძულებით დაკლულ ფრინველთა ხორცი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბეწვიანი ნადირის საკვებად.

შენახვის პირობები და ვადები

ინახება მშრალ, სინათლისაგან დაცულ ადგილას 0°C -დან 25°C-მდე ტემპერატურაზე. შეინახეთ ბავშვებისთვის ხელმიუწვდომელ ადგილას.

ვარგისობის ვადა: 5 წელი.

შეფუთვის გახსნიდან ინარჩუნებს ვარგისიანობას 3 თვე.

მწარმოებელი ქვეყანა: INVESA, ესპანეთი.