

## ნიუვაკ ლასოტა (Newvac la sota)

ნიუკასლის დაავადების საწინააღმდეგო, ატენუირებული ცოცხალი ვაქცინა

**წამლის ფორმა:** პერორალურად მისაღები და თვალში ჩასაწვეთებელი ხსნარი, გამოიყენება ვეტერინარიაში.

### შემადგენლობა

ვაქცინა შეიცავს ცოცხალ ლიოფილიზებულ ლასოტას დაბალი ვირულენტურობის ნიუკასლის დაავადების ვირუსის შტამს. 1 დოზა შეიცავს მინ.  $10^{6.0}$  EID<sub>50</sub> ND ვირუსს.

**გამომშვების ფორმა:** 1000 დოზიანი ფლაკონი.

**ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი:** ბიოლოგიური პრეპარატი

### გამოყენების ჩვენებები

ვაქცინის გამოყენება რეკომენდებულია ჯანმრთელი წიწილების, ინდაურების, მტრედების, ციცრების, ხოხბების, მწყრების ნიუკასლის დაავადების საწინააღმდეგო იმუნიზაციისათვის. ვაქცინა გამოიყენება საწყისი და განმეორებითი ვაქცინაციისათვის.

### გამოყენების წესი და დოზები

ნიუვაკ ლასოტა გამოიყენება თვალში ჩაწვეთების ან წყლთან ერთად დალევინების მეთოდით. პირველი ვაქცინაცია რეკომენდებულია 10-11 დღის ასაკში. რევაქცინაცია ტარდება პირველი ვაქცინაციიდან 4 კვირის შემდეგ.

### ვაქცინის მომზადება:

ლიოფილიზებულ მასას დაამატეთ გამხსნელი ან არადეზინფიცირებული სუფთა წყალი. დაახურეთ რეზინის საცობი და შეანჯღრიეთ მანამ, სანამ არ გაიხსნება. ვაქცინა გამოყენებული უნდა იქნას მომზადებისთანავე.

**თვალში ჩაწვეთების მეთოდი:** მომზადებული ვაქცინის (50 დოზა/5 მლ) თითო წვეთი ეწვეთება თითოეულ თვალში. პიპეტის ზომა უნდა განისაზღვროს ისე, რომ ვაქცინის 1 მლ შეიცავდეს 20 წვეთს.

**ვაქცინაცია წყლის დალევინების მეთოდით:** ვაქცინაციამდე 48 სთ-ით ადრე და ვაქცინაციის შემდეგ 24 საათის განმავლობაში დასალევი წყალი არ უნდა შეიცავდეს

დეზინფექტანტებს და სხვა მედიკამენტებს. დასაღვევი მოწყობილობა უნდა გაირეცხოს სუფთა წყლით. წიწილებს ვაქცინაციამდე 2-4 საათი არ უნდა მიეცეს სასმელი წყალი. ფრინველების სადგომი ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ ფრინველების 2/3-მა ერთდროულად შეძლოს წყლის დაღვევა.

მომზადებული ვაქცინა ემატება არადეზინფიცირებულ წყალს და ეძლევა 30 დღის ასაკის წიწილებს - 10მლ/1 ფრთაზე;

30 დღეზე მეტი ასაკის ფრინველს - 20 მლ/ერთ ფრთაზე.

ყოველი 1000 დოზიანი ვაქცინა იხსნება შემდეგი რაოდენობის სუფთა წყალში:

ასაკი (დღე)	ვაქცინის დოზა (მლ)	წყლის რაოდენობა (ლ)
<30	10-12	1000
>30	15-20	1000

ფრინველს არ ეძლევა სხვა წყალი, სანამ მთლიანად არ დაღვევენ ვაქცინიან წყალს.

## უკუჩვენებები

*ვაქცინაცია არ ტარდება:*

- კლინიკურად დაავადებული ფრინველების, კვების დეფიციტის და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევის შემთხვევაში;
- სხვა ვაქცინაციიდან 10-14 დღის განმავლობაში.
- კვერცხისდების პერიოდში;
- ბუმბულის ცვლის პერიოდში;
- ტრანსპორტირების წინ ან შემდეგ.

## დაყოვნების პერიოდი

7 დღე.

## განსაკუთრებული მითითებები

- ნიუკასლის ვირუსმა შეიძლება ადამიანში გამოიწვიოს თვალის ანთება, რომელიც გრძელდება 2-3 დღის განმავლობაში. ამიტომ მომსახურე პერსონალი უნდა მოერიდოს ვაქცინის თვალთან კონტაქტს.

- ვაქცინა უნდა მომზადდეს იმ რაოდენობით, რომელიც მოიხმარება დაუყოვნებლივ.

- გამოყენებული ბოთლები და გამოუყენებელი ვაქცინა უნდა განადგურდეს.

**შენახვის პირობები:** სინათლისაგან დაცულ ადგილას, 2-8°C-ზე.

**ვარგისიანობის ვადა:** 24 თვე.

**მწარმოებელი ქვეყანა:** პასტერის ინსტიტუტი, რუმინეთი.